



Co je SpaBalancer UltraShock?

SpaBalancer UltraShock je čistící prostředek na bázi oxidu chloridu. Je pětikrát silnější než chlór. SpaBalancer UltraShock spolehlivě ničí choroboplodné zárodky, bakterie a legionelu.

Dezinfekce vody konvenčními dezinfekčními prostředky, jako je chlor nebo brom, zpočátku zneškodní přítomné bakterie. Po určité době však lze pozorovat opětovný růst Legionelle nebo jiných bakterií. Příčinou je tzv. biofilm. Biofilm slouží jako „útočiště a živná půda“ pro bakterie a chrání je před dezinfekčními prostředky.

SpaBalancer UltraShock je jediný dezinfekční přípravek, který proniká biofilmem, ničí polysacharidy (komplexní cukry) v něm obsažené a tím biofilm odstraňuje.

Jak dávkovat SpaBalancer UltraShock?

Přidejte 50 ml přípravku SpaBalancer UltraShock na 1000 litrů vody. Pro lepší promíchání nechte při přidávání přípravku SpaBalancer UltraShock běžet čerpadla. Je důležité, aby SpaBalancer UltraShock působil alespoň 8 hodin. (Pokud necháte přípravek působit méně než 8 hodin, mohou se ve vířivce stále nacházet bakterie a kontaminanty.)

Koncentraci přípravku SpaBalancer UltraShock můžete zkontrolovat pomocí testeru bazénů SpaBalancer. Po 8 hodinách by měl stále ukazovat koncentraci alespoň 1 ppm. Pokud ve vodě po uplynutí osmi hodin nezůstane žádný přípravek SpaBalancer UltraShock, šokovou úpravu opakujte. Důležité: Tyto hodnoty se vztahují k vodě o teplotě 37 stupňů Celsia. V chladnější vodě se SpaBalancer UltraShock rozkládá pomaleji.

Pokud se SpaBalancer UltraShock i po druhé aplikaci rozkládá příliš rychle, může to znamenat silnou kontaminaci potrubí velkým množstvím biofilmu. V tomto případě se doporučuje vyšší dávkování. (Maximálně 200 ml na 1000 litrů vody.)

Jak se měří SpaBalancer UltraShock?

Koncentraci přípravku SpaBalancer UltraShock můžete změřit pomocí testeru bazénů SpaBalancer.

Je dovoleno používat vířivku, pokud je ve vodě SpaBalancer UltraShock?

Koncentrace přípravku SpaBalancer UltraShock by neměla překročit 5 ppm. Při této hladině můžete vířivku bezpečně používat. Vyšší koncentrace mohou způsobit podráždění kůže.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu.

SDB UltraShock

Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 [CLP]



- Výstražné upozornění: nebezpečí
- H290 Může být korozivní pro kovy.
- H302 + H312 + H332 Zdraví škodlivý při požití, styku s kůží nebo při vdechování
- H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a vážné poškození očí.
- H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
- EUH031 Při styku s kyselinou uvolňuje toxický plyn.
- EUH206 Varování! Nepoužívejte v kombinaci s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
- P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
- P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
- P264 Po manipulaci si důkladně umyjte ruce.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranu očí/ochranu obličeje.
- P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
- P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo se osprchujte.
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
- P501 Obsah/obal zlikvidujte v autorizovaném sběrném místě odpadu.

Obsahuje:

- Roztok chlornanu sodného, 4,5 až 11,5 % aktivního chloru
- Chlornan sodný